FLORAÇÃO DE VERÃO

Lista phenologica das observações effectuadas no Jardim Botanico do Rio de Janeiro

Apeiba tibourbou Aubl. — Tiliacea — Nome vulgar: "Pau de jangada". Arvore. Flores amarellas. Guyanas e Venezuela.

Arachis glabrata Benth. — Leg. (Pap.). Herbacea — Flores amarellas. Brasil.

Baccharis mucronata H. B. K. — Composta — Nome vulgar: "Alecrim do matto". Flores alvas. Mexico.

Brunfelsia Hopeana Benth. — Solanacea — Nome vulgar: "Manacá" — Arbusto. Flores roxas, odorantes. Brasil.

Byrsonima sericea D.C. — Malpighiacea — Nome vulgar: "Muricy". Brasil.

Calliandra brevipes Benth. — Leguminosa (Mimos.) — Floração intensa rosea, branca e rosea, de bello effeito. Ornamental. Planta brasileira. Floresce varias vezes por anno.

Cassia fistula Lin. — Leguminosa (Caesalp.) — Nomes vulgares: "Cana-fistula", "Cassia imperial", "Chuva de ouro". Arvore. Flores amarello-ouro em cachos pendentes. Originaria da Asia tropical.

Caesalpinia pyramidalis Tul. — Leguminosa (Caesalp.) — Flores amarellas. Brasil.

Caesalpinia tinctoria Domb. — Leguminosa (Caesalp.) Nome vulgar: "Tintureira". Arvore. Flores amarellas. Colombia.

Celosia argentea Lin. — Amarantacea. Flores branco-prateado. Tropicos.

SciELO/JBRJ

Cereus peruvianus Mill. — Cactacea. Flores alvas. Brasil e Guyanas.

Chorisia crispiflora H.B.K. — Bombacacea. Nome vulgar: "Paineira". — Arvore. Flores roseas, grandes.

Clerodendron fragrans Willd. var. *flore-pleno* Hort. — Verbenacea. Arbusto. Flores de coloração branca, ligeiramente rosea. Originaria da China.

Clerodendron infortunatum Gaertn. — Verbenacea. Flores vermelhas. Indias.

Clitoria amazonum Mart. — Leguminosa (Papil) Floração branco-rosado. Brasil.

Clitoria racemosa Benth. — Leguminosa (Papil). Arvore. Flores roxo-claro. Brasil.

Clitoria Ternatea L. var. *flore-pleno*. Leguminosa (Papil.) Escandente. Flores azues. Tropicos.

Clusia fluminensis Planch et Triana. — Guttifera. Nomes vulgares: "Mangue da praia", "Abano". Flores alvas. Brasil.

Cordia taguahyensis Vell. — Borraginacea. Arbusto. Flores alvas. Brasil.

Couroupita guianensis Aubl. — Lecythidacea. Nomes vulgares: "Castanha de macaco", "Abricó de macaco". Arvore frondosa. Floração em ramos insertos no tronco, desde a base. Flores grandes, carnosas, roseas bonitas. Brasil e Guyanas.

Dahlstedtia pinnata Malme. — Leguminosa (Pap.) — Flores roseo-roxeadas. Brasil.

Desmodium discolor Vog. — Leguminosa (Pap.) Nome vulgar: "Marmelada de cavallo". Flores roxas. Brasil.

Epidendrum difforme Jacq. — Orchidacea. Flores amarello-limão, abundantes, pequenas. Brasil.

Eryngium serra Cham. et Schlech. — Umbellifera — Brasil.

Erythrina corallodendron Lin. — Leguminosa (Pap.) — Nomes vulgares: "Flor de coral", "mulungu", "Suiñã". Flores vermelho alaranjadas. America boreal e Indias occidentaes.

Eugenia caryophyllata Thunb. — Myrtacea. "Craveiro da India" — Arvore. Flores pequenas, brancas. India.

Eugenia malaccensis Lin. Myrtacea. Arvore. Floração intensa, roxa. Fructo comestivel. Asia.

Galphimia gracilis Bartl. — Malpighiacea. — Flores amarellas. Mexico.

SciELO/JBRJ

Garcinia Livingstonei T. Anders. — Guttifera. — Arvore. Floração branco-amarellado, odorante. Africa tropical.

Grewia paniculata Roxb. — Tiliacea. Arvore. Cachos amarellos, abundantes. Originaria da Malaya.

Hedychium coccineum Buch. Ham. Zingiberacea. — Flores vermelhas.

Hedychium spicatum Ham. — Zingiberacea. Flores alvas. India oriental.

Hibiscus rosa-sinensis L. var. *fulgens* Hort. Malvacea. Flores vermelhas.

Hibiscus rosa-sinensis L. var. *zebrinus* Hort. — Malvacea. Rosa.

Honckenya ficifolia Willd. — Tiliacea. Arbusto. Flores roxas. Africa.

Ipomoea fistulosa Mart. — Convolvulacea. Nome vulgar: "Algodão do pantano". Flores roxas. Brasil.

Isotoma longiflora Presl. — Campanulacea. Nomes vulgares: "Juati", "Céga-olho", "Arrebenta-cavallo", "Jasmim da Italia", Flores alvas. Indias occidentaes.

Kerria japonica DC. — Rosacea. Flores amarello-ouro. Japão.

Kopsia fructicosa A.DC. — Apocynacea. Flores roseas. Malaya.

Lafoensia replicata Pohl. var. *adenophylla* Koehne. — Lythracea. Flores alvas com calice roxo. Brasil.

Lagerstroemia flos-reginae Retz. — Lythracea. Arvore. Floração em grandes cachos roseo-violaceos, erectos. Asia tropical.

Lagerstroemia indica L. — Lythracea. Flores roxo — roseo. China.

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Lythracea. Arvore. Flores roxas. Asia.

Lecythis lanceolata, Poir. — Lecythidacea. Nomes vulgares: "Sapucaia branca", "Sapucaia-mirim". Flores roseas roxeadas. Brasileira.

Lippia lycioides Steud. Verbenacea. Nome vulgar: "Cedron". Flores alvas, odorantes. Brasil.

Medinilla venosa Blume. — Melastomatacea. Arvore. Flores em grandes cachos pendentes, com bracteas roseo-carregado. Muito bonita. Malaya.

Mimosa pudica L. — Leguminosa (Mim.) Nome vulgar: "Sensitiva". Flores roxas. Brasil.

Mimosa sepiaria Benth. — Leguminosa (Mim.) "Nome vulgar: "Espinho de Maricá". Arbusto. Flores alvas. Brasil.

cm 1 2 3 SciELO/JBRJ 10 11 12

Monodora myristica Dun. — Anonacea. Arvore. Flores abundantes. grandes, pendentes, de coloração amarella, pintalgadas de marron. Africa.

Parkia pendula Benth. — Leguminosa (Pap.) Nome vulgar: "Visgueiro". Flores vermelhas em capitulos pendentes Brasil.

Pavonia spinifex Cav. Malvacea. Nome vulgar: "Arranca estrepe". Flores amarellas. Brasil.

Pentagonia spathicalix Schum. — Rubiacea. Flores amarellas. Brasil.

Piptadenia colubrina, Benth. — Leguminosa (Mim.) Nome vulgar "Angico". Arvore. Flores alvas. Brasil.

Pontederia cordata Lin. — Pontederiacea. Planta aquatica, herbacea. Flores roxas. America tropical.

Rheedia longifolia Planch et Triana. — Guttifera. Nome vulgar: "Bacupary". Flores amarello-claro. Fructos comestiveis. Brasil.

Rheedia macrophylla Pl. et Tr. — Guttifera. Arvore. Nome vulgar: "Bacury-pary". Flores pequenas, branco amarelladas, abundantes. Fructo comestivel. Brasil.

Schwannia elegans Juss. — Malpighiacea. Planta de curiosa floração, com quatro flores em cada haste, sendo duas roseas e duas brancas. Brasil e Paraguay.

Solanum sisymbrifolium Lam. Solanacea. Flores violaceas. America boreal e Mexico.

Tamarindus indica L. — Leguminosa (Caes.) Nome vulgar: "Tamarindo". Flores amarello-alaranjado. Africa.

Tecomaria capensis Spach. — Bignoniacea. Flores de côr "fraise", avermelhada. Africa do sul.

Tibouchina granulosa Cogn. — Melastomatacea. Nomes vulgares: "Flor de quaresma", "Quaresma". Flores roxas.

Turnera aurantiaca Benth. — Turneracea. Arbusto. Flor côr de laranja. Brasil e Guyanas.

Vangueria edulis Vahl — Rubiacea. Flores alvas. Africa tropical.

Victoria regia Lindl. — Nymphaeacea. Nomes vulgares. "Forno de jaçanã", "Forno d'agua", "Mururé", "Victoria regia". Flores alvas. Brasil.

Zephyranthes candida Herb. — Amaryllidacea. Flores alvas. Argentina.

L. A. P.

SciELO/JBRJ